

ARRÊTEZ

Précautions contre la transmission par contact



En plus des pratiques de base

Assignez ou nettoyez et désinfectez l'équipement partagé

Précautions contre la transmission par contact

(Autres MPI d'après les pratiques de base et l'évaluation des risques)

Prenez ces précautions contre la transmission par contact en cas de :

- Diarrhée
- Drainage de plaies infectées si on ne peut pas contenir les sécrétions
- Poux et gale
- *C. difficile* * (requiert le nettoyage de la chambre deux fois par jour)
- Norovirus : Se servir des précautions contre la transmission par gouttelettes / contact si le patient vomit.
- Organismes résistants aux antimicrobiens (ORA)
 - Exemples: 1. SARM (*Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline)
 - 2. ERV (Entérocoque résistant à la vancomycine)
 - 3. BLSE (Bêta-lactamase à spectre étendu)
 - 4. Pseudomonas multirésistant aux antibiotiques

ATTENTION : Les maladies ou conditions qui requièrent ces mêmes précautions ne sont pas toutes nommées.

CONSIGNES

Soins aigus

- Portez les gants à l'entrée de la chambre
- Portez la blouse pour tous les soins directs ou contact avec l'environnement

Soins autres que les soins aigus

- Portez la blouse pour tous les soins directs ou contact avec l'environnement du client / résident

- Se laver les mains avant et après les soins, traitements et / ou contact avec l'environnement du patient
- Ne pas partager l'équipement sanitaire
- Les personnes peuvent sortir de leur chambre aux conditions suivantes : **M**ains propres; **V**êtements et équipement propres; **D**rainage contenu; **C**ontinence (retenue); et **C**onformité aux normes.
- Assigner ou nettoyer et désinfecter l'équipement partagé après chaque usage.

Alertez le département de Prévention et contrôle des infections

