

ARRÊTEZ

Précautions contre la transmission par contact / gouttelettes



En plus des pratiques de base

Assignez ou nettoyez et désinfectez l'équipement partagé

Précautions contre la transmission par contact / gouttelettes

(Autres MPI d'après les pratiques de base et l'évaluation des risques)

Prenez ces précautions contre la transmission par contact / gouttelettes en cas de :

- Toux nouvelle ou aggravée (de 7 jours ou moins) ou souffle court nouveau ou aggravé anormal pour le patient ET UNE FIÈVRE DE 38° C ou plus (les patients âgés ou immunocompromis peuvent ne pas présenter de fièvre).
- Grippe (influenza) saisonnière
- Toutes maladies respiratoires virales aiguës
- Norovirus— en présence de vomissements
- Streptocoque du Groupe A invasif — **si drainage de la plaie — jusqu'à 24 h de thérapie antibiotique appropriée**

ATTENTION : Les maladies ou conditions qui requièrent ces mêmes précautions ne sont pas toutes nommées.

CONSIGNES

Soins aigus

- Portez les gants à l'entrée de la chambre
- Portez la blouse pour tous les soins directs ou contact avec l'environnement du patient
- Portez un masque procédural / chirurgical et un protecteur oculaire à deux mètres du patient

Soins autres que les soins aigus

- Portez les gants et la blouse pour tous soins directs ou contact avec l'environnement du client / résident
- Portez un masque procédural / chirurgical et un protecteur oculaire à deux mètres du patient

- Se laver les mains avant et après les soins, les traitements et / ou le contact avec l'environnement du patient
- Maintenir une séparation de 2 mètres entre chaque patient et tirer les rideaux
- Le patient doit porter le masque procédural / chirurgical en dehors du milieu d'isolation
- Assigner ou nettoyer et désinfecter l'équipement partagé après chaque usage

**Alertez le département de Prévention et
de contrôle des infections**